

# 高血压患者

① 中风前征兆 ②

四川★南充

樊【男】

1964 年 61 岁

2025 年 12 月

追踪进度报告

## 標題 1 發現情況：

2025 年于南充市首德-儀龍灣住宅；演示太賀系列产品时，在吃饭前大家聊天讨论时、不经意的情况下、自行使用血压计检测后；发现『血压·超高』大伙儿都不太敢相信！然后；大家开始一起验证，原本以为是否机器有问题！后来发现原来真的是超高血压问题。

隨后进行相关处置，经过不断重复的验证，以及他个人这几天在工地的感受、极有可能『中风前征兆』已经产生！因为在 2 天前『工地』作业时、有 2 度头部晕眩感受！果然；在后续的实际体验及检测，证实为『高血压·患者』。

**建議：**每天早晨起床，以及中午休息、与晚间下班后『各別使用太賀产品』作为观测现象。

- **危險性-1**；此地清晨特別寒冷、尤其他本人需要清晨 5 点多就前往工地(承包工程·负责人)需要分配工作任务！如果温差过大、极有可能会有『心血管』或『脑血管』造成的问题。
- **危險性-2**；自认为没有问题(身高与体重都比较娇小)从为思考过会有高血压问题，就不会去在意风险性问题！
- **严重危險性问题**；工地是属于『高危险性区..域』如果有任何情况、都有可能造成无法挽回的憾事！！

## 標題 2 對應方針：

- 每天进行 3 次理疗；清晨『起床后』即刻使用。【太賀 THzP 系列产品；进行实际测试】中午休息时间、返回进行 2 次理疗。晚上下班后；再进行第 3 次理疗。
- **实际记录观察所有步骤及发生现象：**每天自行冲泡养生茶，带着当成『饮用水』饮用●

## 实际体验过程纪录表

	(白天)使用前			(白天)使用后			时间 AM	晚间-使用前			晚间-使用后			时间 PM	茶包	血球	
	高压	低压	脉搏	高压	低压	脉搏		高压	低压	脉搏	高压	低压	脉搏				
第1天								185	117	64	145	100	73	19:40	○	×	
第2天	180	112	77	156	89	71	12:30	180	116	71	158	95	79	21:00	○	×	
第3天								170	107	65	151	96	77	19:00	×	×	
第4天								148	96	65	139	90	72	18:15	○	○	
第5天																	
第6天	工地感觉头部晕眩 2 回																
第7天																	
周 报	第四天后；由于仪器零件尚未抵达、有延误 3 天没有使用！																
第8天	177	111	64	149	97	72	07:30	165	96	78	155	96	75	19:30	○	×	
第9天	工地感觉头部晕眩、医生检测高血压							164	109	77	149	96	85	19:30	×	×	
第10天	172	98	84	161	93	83	12:30	医生建议作完整检测							○	×	
第11天	160	91	75	150	93	77	12:30	130	89	81	128	89	77	18:30	○	×	
第12天	151	97	72				12:30	147	102	87	147	91	82	19:00	○	×	
第13天	155	97	78	144	89	87	12:30	154	100	74	145	93	78	19:00	○	×	
第14天	中午衣服太厚 * 没有量血压							13:00	155	103	67	143	93	80	20:00	○	×
周 报	第五天早晨 → 感受到“晨勃”现象！																
第15天	154	94	68	143	87	78	09:30	153	95	73	150	91	72	19:30	○	×	

第16天	165	102	62	143	79	77	12:30	150	92	72	没有测量	20:00	○	X
第17天														
本人过程														
	三阶段实际测试	使用前	使用 15 分钟	使用 30 分钟后										
母亲体验过程														